

FICHE PATIENT

Pr ZYNZY® (rétifanlimab)

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ POUR RÉDUIRE AU MINIMUM LE RISQUE D'EFFETS INDÉSIRABLES À MÉDIATION IMMUNITAIRE

Ce médicament peut causer des effets secondaires graves, qui peuvent parfois mettre la vie en danger et être fatals. Ils peuvent survenir à tout moment pendant le traitement, ou même après la fin du traitement. Vous pouvez présenter plus d'un effet secondaire en même temps.

Communiquez immédiatement avec votre médecin si vous présentez des signes ou symptômes, même s'ils ne sont pas inclus dans cette liste. Votre médecin peut vous prescrire d'autres médicaments pour prévenir des complications plus graves et soulager vos symptômes. Il peut également interrompre ou arrêter le traitement par ZYNZY®.

Ce document a été développé par Incyte Biosciences Canada Corporation dans le cadre d'un plan de gestion des risques pour ZYNZY®. Ce document n'est pas destiné à un usage promotionnel.

Pr
ZYNZY[®]
rétifanlimab pour injection
500 mg / 20 mL (25 mg / mL)

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS PRÉSENTEZ L'UN OU L'AUTRE DES SYMPTÔMES OU EFFETS SECONDAIRES SUIVANTS :

Poumons

- Difficultés respiratoires
- Douleurs thoraciques
- Apparition ou aggravation de la toux

Intestins

- Diarrhée fréquente souvent accompagnée de sang et/ou de mucus
- Selles plus abondantes que d'habitude
- Selles sanguinolentes, noires ou goudronneuses
- Douleur ou sensibilité abdominale sévère

Foie

- Nausées ou vomissements persistants
- Perte d'appétit
- Douleur sur le côté droit de l'estomac
- Jaunissement des yeux et/ou de la peau
- Somnolence
- Urine de couleur foncée
- Saignements ou ecchymoses qui surviennent plus facilement que d'habitude

Reins

- Diminution du volume des urines
- Urine mousseuse
- Présence de sang ou de traces de sang dans les urines qui peuvent changer de couleur
- Chevilles enflées
- Perte d'appétit

Glandes hormonales

- Problèmes de la glande thyroïde
- Maux de tête
- Nausées
- Vomissements
- Soif accrue
- Troubles de la vision

Diabète de type 1 ou acidocétose diabétique

- Difficultés à penser clairement
- Somnolence
- Douleurs à l'estomac
- Respiration rapide et profonde
- Haleine à l'odeur sucrée ou fruitée
- Goût sucré ou métallique dans la bouche
- Odeur différente de l'urine ou de la sueur

Peau

- Frissons
- Tremblements ou fièvre
- Démangeaisons ou éruptions cutanées
- Bouffées de chaleur ou gonflement du visage
- Essoufflement ou respiration sifflante
- Étourdissements ou sensation d'évanouissement
- Douleurs au dos ou au cou
- Nausées
- Vomissements
- Douleurs abdominales

Autres organes

- Inflammation du pancréas, des yeux, des articulations, ou du tissu situé entre le muscle et la peau pouvant entraîner un gonflement
- Douleurs musculaires et osseuses
- Pincement d'un nerf

COORDONNÉES IMPORTANTES

Nom du spécialiste

N° de téléphone au bureau

N° de téléphone après les heures de bureau

Nom du patient

N° de téléphone du patient

Personne-resource à contacter en cas d'urgence

N° de téléphone de la personne-resource

IMPORTANT

- N'essayez pas de traiter les effets secondaires par vous-même.
- N'arrêtez pas votre traitement par ZYNYZ® sans en avoir discuté avec votre médecin.
- Gardez cette carte sur vous en tout temps, surtout lorsque vous voyagez, chaque fois que vous vous rendez aux urgences ou lorsque vous devez consulter un autre médecin.
- Gardez cette carte pendant au moins 4 mois après votre dernière dose de ZYNYZ®.
- Ces mises en garde s'appliquent également à tout effet secondaire non mentionné sur cette carte. Vous pouvez également déclarer des effets secondaires en consultant la page Web www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html ou en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345. La déclaration d'effets secondaires peut aider à fournir de plus amples renseignements sur l'innocuité de ce médicament.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Ce patient prend le médicament ZYNYZ® (rétifanlimab), qui peut causer des effets indésirables à médiation immunitaire pouvant survenir à tout moment pendant le traitement ou même après la fin du traitement. Évaluez le patient pour déceler les signes et symptômes d'effets indésirables à médiation immunitaire. Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire au minimum toute conséquence de réactions à médiation immunitaire.

Des lignes directrices spécifiques pour la prise en charge d'effets indésirables à médiation immunitaire sont présentées dans le monographie de produit du rétifanlimab.

Il peut être utile de consulter un oncologue ou un autre spécialiste médical pour la prise en charge d'effets indésirables à médiation immunitaire touchant un organe en particulier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la [monographie du produit au pdf.hres.ca/dpd_pm/00078752.PDF](http://pdf.hres.ca/dpd_pm/00078752.PDF) ou appelez Incyte au 1-833-309-2759.



MINISTÈRE
DES
MÉDICAMENTS
NOVATEURS
CANADA

ZYNYZ et son logo sont des marques déposées d'Incyte. Incyte et son logo sont des marques déposées d'Incyte. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2025, Incyte Biosciences Canada Corporation.